



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367001, г. Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел.: (8722) 67-18-48, e-mail: obrazovanie@da.gov.ru

№ 13785/К6-2019-30.12.19
На № _____ от _____

**Главам администраций
муниципальных районов,
городских округов**

Министерство образования и науки Республики Дагестан направляет письмо ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Республики Дагестан о Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика туберкулеза».

В целях противодействия распространению туберкулеза среди детей и подростков, а также координации взаимодействия, Министерство образования и науки Республики Дагестан просит довести указанную информацию до руководителей всех образовательных учреждений.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра

А. Арухова





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГБУ РД «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»
Р.Д., г. Махачкала, ул. Кадырова, 19 тел/факс: 67-29-36; 67-47-45

Министру образования Республики Дагестан
Омарова У. А.

Уважаемая Уммупазиль Авадзиевна !

Довожу до Вашего сведения, что в 2014 году вступили в силу Санитарно-эпидемиологические Правила «Профилактика туберкулеза» (СП 3.1.2.3114-13).

Согласно данным СП п. 4.18. ответственность за организацию прохождения профилактических, медицинских осмотров на туберкулез возлагается на руководство организации по месту работы, учебы лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез. Работники образовательных и спортивных учреждений для детей и подростков проходят профилактические медицинские осмотры на туберкулез 1 раз в год (п. 4.13.). Приказом по образовательному учреждению должно быть выделено лицо, осуществляющее контроль за своевременностью и полнотой охвата сотрудников (штатных, внештатных, в т.ч. совместителей) профилактическими флюорографическими осмотрами.

Наряду с этим, всем детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб в целях раннего выявления туберкулеза проводится туберкулинодиагностика (п. 5.1.).

В последующем в соответствии с п. 5.6. в течение 6 дней с момента проведения туберкулиновой пробы направляются на консультацию в противотуберкулезный диспансер либо тубкабинет ЦРБ по месту жительства следующие категории детей:

- с впервые выявленной положительной реакцией (папула 5 мм и более), не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза;
- с длительно сохраняющейся (4 года) реакцией (с инфильтратом 12 мм и более);
- с увеличением инфильтрата на 6 мм и более чувствительности к туберкулину у туберкулиноположительных детей;
- увеличение менее чем на 6 мм, но с образованием инфильтрата размером 12 мм и более;
- с гиперреакцией на туберкулин (инфильтрат 17 мм и более, а так же везикуло-некротические реакции и лимфангит).

В случаях, если родители или законные представители детей, направленных на консультацию к фтизиатру, не представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, такие дети в детские организации не допускаются. Наряду с этим дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (п.5.7.).

В целях раннего выявления туберкулеза у подростков проводятся 2 исследования - плановая ежегодная туберкулинодиагностика и периодические (флюорографические) осмотры (п. 6.1.).

Подросткам, посещающим образовательные организации, в том числе школы, школы-интернаты, колледжи, гимназии, лицей, средние специальные и высшие учебные заведения, а также работникам организаций, имеющих медицинский кабинет, туберкулинодиагностика проводится медицинскими работниками данной организации,

имеющими справку-допуск, а при их отсутствии - медицинскими работниками, имеющими справку-допуск. медицинской организации, на территории обслуживания которой располагается организация (п. 6.5.).

В течение 6 дней с момента постановки пробы Манту направляются на консультацию к фтизиатру следующие категории подростков (п. 6.7.):

- с впервые обнаруженной положительной реакцией на туберкулин (инфильтрат 5 мм и более), не связанной с предшествующей иммунизацией против туберкулеза;
- с гиперреакцией на туберкулин (инфильтрат 17 мм и более или меньших размеров, но везикуло-некротического характера и наличием лимфоидита);
- с нарастанием чувствительности к туберкулину - увеличение инфильтрата на 6 мм и более;
- с постепенным нарастанием чувствительности к туберкулину по годам до 12 мм и более.

Так же как и у детей, подростки, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, не представившие руководителю организации в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, к работе (учебе) не допускаются (п. 6.8.).

Профилактический флюорографический осмотр проводится подросткам в возрасте 15 и 17 лет. При отсутствии данных о проведении профилактических осмотров флюорографический осмотр проводится во внеочередном порядке (п. 6.10.).

Однако, Санитарными Правилами определены четкие показания для проведения подросткам флюорографических профилактических осмотров 1 и даже 2 раза в год.

При регистрации заболеваемости туберкулезом на территории муниципального образования 40 случаев на 100 тысяч населения в год, а так в случаях проживания подростков в социально неблагополучных семьях и семьях иностранных граждан, прибывших из неблагополучных по туберкулезу стран, им проводится профилактическое флюорографическое обследование ежегодно 1 раз в год (п. 6.10.).

В случаях, если подросток состоит на диспансерном учете в наркологических, психиатрических учреждениях, а также страдает ВИЧ-инфекцией, флюорографическое обследование проводится 2 раза в год (п. 6.12.).

Подросткам, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, онкогематологическими заболеваниями, с ювенильным ревматоидным артритом, сахарным диабетом, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию, профилактический медицинский осмотр с целью выявления туберкулеза проводится 2 раза в год, но при этом чередуя туберкулинодиагностику и флюорографическое обследование (п. 6.11.).

В целях противодействия распространения туберкулеза среди детей и подростков, а так же координации взаимодействий прошу Вас довести данную информацию до всех руководителей образовательных учреждений области. При этом обращаю Ваше внимание, что соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц (п.1.3.).

Главный врач ГБУ РПТД
Главный внештатный специалист
Заведующая детско-подростковым отделением



Абдурахманов А.М.

Забирова Д.Н.